



Repères

Entre 250 et 300°C = démarrage des mises à l'herbe précoces
300-350 °C = semis et sursemis de prairies
500 °C = fin du 1^{er} tour de pâturage et arrêt du déprimage
650 – 700 °C = début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)

Exploitations suivies en 2024

Lezoux (320 m-VL bio)	Fin du 1 ^{er} tour
Manglieu (460 m – bio)	Début du 2 nd tour sur les parcelles fertiles
Ambert (560 m – VA)	Fin du 1 ^{er} tour du lot 1. Mise à l'herbe du lot 2.
St Maurice près Pionsat (600 m -VA)	Mise à l'herbe d'un lot en fin de semaine
Tours sur Meymont (620 m – VL+VA bio)	60 ^{ème} j de pâturage. Fin du 2 nd tour des VL. Sortie des VA.
Biollet (700 m -VA)	Azote sur fauches tardives
Ceyssat (800 m– OL + VA)	Mise à l'herbe dès que les conditions le permettront
St Genès la Tourette (830 m – VL bio)	Mise à l'herbe prévue cette semaine
Egliseneuve d'Entraigüe (1050 m -VL)	Mise à l'herbe dès que les conditions le permettront

CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 31 mars 2024 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18°, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	549 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	448 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100 m)	317 °	Montagne (> 1100 m)	253 °
Rappel 2023 : 459 °		Rappel 2023 : 373 °		Rappel 2023 : 259 °		Rappel 2023 : 213 °	
CLERMONT 330 m	567 °	SAYAT 550 m	499 °	CHALMAZEL (42) 990 m	333 °	ANZAT LUGUET 1270 m	244 °
ISSOIRE 372 m	548 °	AMBERT 555 m	462 °	VERNINES 1045 m	337 °	MONT-DORE 1220 m	263 °
COURPIERE 455 m	532 °	ST-GERVAIS 705 m	430 °	ST-GERMAIN L'H. 1070 m	302 °		
(MOISSAT)* 340 m	NC	ST-SUPLICE 851 m	377 °	MARCENAT (15) 1075 m	297 °	<i>*source technicien</i>	
Gain de la semaine : 70 °		Gain de la semaine : 55 °		Gain de la semaine : 40 °		Gain de la semaine : 28 °	

Conseils de la semaine : Plein pâturage en plaine. En demi-montagne, déprimage encore possible cette semaine. Sur les plateaux d'altitude, début des mises à l'herbe et préparation des mises à l'herbe en montagne.

Une météo plus clémente (absence de gel, neige et douceur) devrait enclencher / accélérer la pousse de l'herbe. Jusqu'à présent, les parcelles mouillées peinent à démarrer. Créer une entrée et une sortie dans les paddocks limitent considérablement les dégâts liés au piétinement.

En plaine, la pousse est conséquente sur les parcelles n'ayant pas subi un 1^{er} pâturage ras et devrait s'accélérer. Profiter de cette croissance pour favoriser l'ingestion d'herbe et limiter fortement la complémentation après la phase de transition. Arrêter le déprimage.

En demi-montagne, la pousse s'active. Tous les troupeaux devraient être sortis, d'autant que le repère des 500° sera atteint cette semaine. Un 1^{er} tour avant ce repère permet d'homogénéiser le couvert (moins de zone de refus), d'offrir une herbe d'excellente qualité et permet une repousse active. Ne pas hésiter à tourner vite. Le déprimage des fauches est encore possible. A partir de la semaine prochaine, leur rendement futur sera pénalisé.

Sur les plateaux d'altitude, les mises à l'herbe pourront débuter seulement si la portance le permet. Il en va de la préservation des prairies et du confort des animaux. Les hauteurs étant encore très faibles, la sortie doit s'accompagner d'ajout conséquent de fourrage. Veillez à adapter la complémentation minérale.

En montagne, seules les prairies fertiles avaient reverdi avant le froid et la neige. Attendre le ressuyage des parcelles pour étaupiner sous peine de dégrader fortement le couvert.